



Inizio fioritura - 10% delle caliptré staccate dal ricettacolo.

61



Fioritura - 20-30% dei fiori aperti.

62-63

FASE FENOLOGICA

**Bottoni fiorali separati (BBCH 57);
Inizio fioritura (BBCH 61);
Fioritura-20-30% dei fiori aperti (BBCH 62-63).**

(Fonte: *reterurale*, ERSA – Baggjolini)

Previsioni meteo: Probabili piogge nel fine settimana a partire da sabato. Tempo in peggioramento ad inizio prossima settimana.

PERONOSPORA

Presenza di sporadiche macchie di peronospora nella zona di Narni, Calvi, Baschi, Orvieto, Bettona.

In considerazione della delicata fase fenologica e prevista instabilità climatica si consiglia di assicurare la protezione antiperonosporica con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb, acilalanine, metalaxil-m, benalaxil, benalaxil-m, ecc..., scelti in funzione della fase fenologica raggiunta, associati a prodotti di copertura.

OIDIO

In assenza di copertura antioidica abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente spiroxamina, IBE, ecc.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>